

3. MODELO DE EXAMEN

FÍSICA

- Responda en el pliego en blanco a **cinco ejercicios cualesquiera** a elegir de las ocho que se proponen. Todos los ejercicios se calificarán con un máximo de **2 puntos**.
- Agrupaciones de ejercicios que sumen más de 10 puntos o que no coincidan con las indicadas conllevarán la **anulación** de lo(s) último(s) ejercicio(s) seleccionado(s) y/o respondido(s).

| DATOS y CONSTANTES FÍSICAS | | | |
|--|---|--|--|
| $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$ | $ q_e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ | $m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$ | $m_p = 1.7 \times 10^{-27} \text{ kg}$ |
| $K = 9 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$ | $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ átomos/mol}$ | $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ | $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ |
| | | | |
| | | | |

Ejercicio 1.

En el año 2119 una astronauta que forma parte de una misión espacial internacional llega a un planeta esférico en una lejana galaxia. Una vez en la superficie del planeta la astronauta observa que al dejar caer una pequeña roca desde una altura de 1.90 m llega al suelo con una velocidad de 8 m/s. Si el radio del planeta es $8.60 \times 10^7 \text{ m}$, calcule:

- La aceleración de la gravedad en la superficie del planeta. (1 punto)
- La velocidad de escape del planeta. (1 punto)

Ejercicio 2.

Dos esferas A y B, con masas respectivas $m_A = 5 \text{ kg}$ y $m_B = 10 \text{ kg}$, se encuentran en reposo a una distancia entre sus centros de 1 m. Una pequeña bola, de masa $m = 100 \text{ g}$, se deja en reposo en un punto Q del segmento que une A con B y a una distancia de 40 cm del centro de A. Asuma que las únicas fuerzas que actúan sobre la bola son las fuerzas gravitatorias debidas a las esferas A y B. Calcule:

- La intensidad de campo gravitatorio en el punto Q en que se sitúa inicialmente la bola. (0.75 puntos)
- El trabajo realizado por el campo gravitatorio cuando la bola se haya desplazado hasta el punto S del mismo segmento y que dista 80 cm del centro de la esfera B. Razone si este desplazamiento de la bola será espontáneo. (0.75 puntos)
- Busque el punto de equilibrio entre ambas esferas para la pequeña bola de masa m . (0.5 puntos)

Ejercicio 3.

Un electrón se mueve con velocidad constante $v_0 = 1.41 \times 10^6 \text{ m/s}$ a lo largo del eje +y. Calcule:

- El módulo, la dirección y el sentido del campo magnético que habría que aplicar para que el electrón describiera una trayectoria circular de diámetro 10 cm en sentido horario. (1 punto)
- El módulo, la dirección y el sentido de la fuerza que actúa sobre el electrón. (0.5 puntos)
- Calcule el radio de la trayectoria y el sentido de giro de un protón bajo la acción del mismo campo magnético. (0.5 puntos)

Ejercicio 4.

Dos cargas puntuales con cargas $q_1 = 10 \mu\text{C}$ y $q_2 = -40 \mu\text{C}$ se disponen en el vacío en posiciones fijas separadas 1 m una de otra. Determinar:

- Un punto A donde se anule el campo eléctrico. (0.5 puntos)
- Un punto B donde sea nulo el potencial eléctrico. (0.5 puntos)
- El trabajo para trasladar un protón desde el punto A al punto B. (1 punto)

Ejercicio 5.

Un objeto de 7 cm de altura se coloca 10 cm a la izquierda de una lente delgada divergente de distancia focal 25 cm.

- Dibuje el diagrama de rayos principales mostrando la formación de la imagen. (1.25 puntos)
- Determine: la posición, la orientación, el tamaño y la naturaleza de la imagen. (0.75 puntos)

Ejercicio 6.

Una cuerda larga y tensa tiene uno de sus extremos fijo a una pared. El otro extremo lo agarra una persona proporcionándole un movimiento vertical sinusoidal con una frecuencia de 2 Hz y una amplitud de 7.5 cm. La velocidad de propagación de la onda a lo largo de la cuerda es $v = 12$ m/s. En el instante inicial, $t = 0$, el extremo sujetado por la persona está en la posición de máximo desplazamiento vertical positivo e instantáneamente en reposo. Asumimos que no existen ondas propagándose desde el extremo fijo de la cuerda ni amortiguación debida al rozamiento con el aire.

a. Calcule y exprese en unidades del Sistema Internacional la amplitud de la onda, la frecuencia angular, el periodo, la longitud de onda y el número de onda. (1 punto)

b. Escriba la ecuación de la onda y determine la elongación de un punto de la cuerda cuando su velocidad es máxima. (1 punto)

Ejercicio 7.

El isótopo ^{57}Co , por captura de un electrón, decae a ^{57}Fe con un período de semidesintegración de 272 días. El núcleo de ^{57}Fe se produce en un estado excitado, y casi instantáneamente emite rayos gamma que pueden ser detectados. Calcule para una muestra radiactiva de ^{57}Co :

a. La vida media y la constante de desintegración radiactiva del ^{57}Co . (1 punto)

b. El número de moles del isótopo ^{57}Co en la muestra si la actividad inicial es de 7.1×10^{16} Bq. (1 punto)

Ejercicio 8.

Un electrón posee una energía cinética de 0.5 eV. Calcule:

a. La longitud de onda asociada al electrón. (1 punto)

b. La longitud de onda de un fotón con la misma energía de 0.5 eV. (1 punto)



4. MODELO DE EXAMEN RESUELTO Y CRITERIOS ESPECIFICOS DE CORRECIÓN

1. En el año 2119 una astronauta que forma parte de una misión espacial internacional llega a un planeta esférico en una lejana galaxia. Una vez en la superficie del planeta la astronauta observa que al dejar caer una pequeña roca desde una altura de 1.90 m llega al suelo con una velocidad de 8 m/s. Si el radio del planeta es 8.60×10^7 m, calcule:
 - a. La aceleración de la gravedad en la superficie del planeta. (1 punto)
 - b. La velocidad de escape del planeta. (1 punto)

SOLUCIÓN

- a. Llamamos A al punto desde el que se deja caer la pequeña roca y B el punto de impacto con la superficie del planeta. La distancia entre A y B es de 1.9 m. Además, consideramos que la altura $h = 1.9$ m es mucho menor que el radio del planeta; $h \ll R_P$.

$$E_m = \text{cte} \implies (E_m)_A = (E_m)_B \implies -\frac{GM_P m}{R_P + h} = -\frac{GM_P m}{R_P} + \frac{1}{2}mv^2$$

$$2GM_P \left(\frac{1}{R_P} - \frac{1}{R_P + h} \right) = v^2 \implies v^2 = \frac{2GM_P h}{R_P(R_P + h)} \cong \frac{2GM_P h}{R_P^2} = 2g_P h \implies g_P = \frac{v^2}{2h}$$

$$g_P = \frac{8^2 (\text{m}^2/\text{s}^2)}{2 \times 1.9 (\text{m})} = 16.8 \text{ m/s}^2$$


b.

$$\frac{1}{2}mv_{\text{escape}}^2 - \frac{GM_P m}{R_P} = 0 \implies v_{\text{escape}}^2 = \frac{2GM_P}{R_P} = 2g_P R_P \implies v_{\text{escape}} = \sqrt{2g_P R_P}$$

$$v_{\text{escape}} = \sqrt{2 \times 16.8 (\text{m/s}^2) \times 8.6 \times 10^7 (\text{m})} = 5.38 \times 10^4 \text{ m/s}$$



2. Dos esferas A y B, con masas respectivas $m_A = 5 \text{ kg}$ y $m_B = 10 \text{ kg}$, se encuentran en reposo a una distancia entre sus centros de 1 m. Una pequeña bola, de masa $m = 100 \text{ g}$, se deja en reposo en un punto Q del segmento que une A con B y a una distancia de 40 cm del centro de A. Asuma que las únicas fuerzas que actúan sobre la bola son las fuerzas gravitatorias debidas a las esferas A y B. Calcule:
- La intensidad de campo gravitatorio en el punto Q en que se sitúa inicialmente la bola. (0.75 puntos)
 - El trabajo realizado por el campo gravitatorio cuando la bola se haya desplazado hasta el punto S del mismo segmento y que dista 80 cm del centro de la esfera B. Razone si este desplazamiento de la bola será espontáneo. (0.75 puntos)
 - Busque el punto de equilibrio entre ambas esferas para la pequeña bola de masa m . (0.5 puntos)

SOLUCIÓN

- a. Consideramos que las tres masas se encuentran a lo largo del eje X y como sentido positivo el que va del punto A al B:

$$\begin{aligned}g_{AQ} &= \frac{Gm_A}{d_{AQ}^2} & g_{BQ} &= \frac{Gm_B}{d_{BQ}^2} \Rightarrow \vec{g}_Q = \vec{g}_{AQ} + \vec{g}_{BQ} \Rightarrow \vec{g}_Q = G \left(-\frac{m_A}{d_{AQ}^2} + \frac{m_B}{d_{BQ}^2} \right) \hat{i} \\ \vec{g}_Q &= 6.67 \times 10^{-11} (\text{N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2) \times \left(-\frac{5 \text{ (kg)}}{0.4^2 \text{ (m}^2)} + \frac{10 \text{ (kg)}}{0.6^2 \text{ (m}^2)} \right) \hat{i} = -2.32 \times 10^{-10} \frac{\text{N}}{\text{kg}} \hat{i} \rightarrow \text{(en sentido hacia A)}$$

b.

$$\begin{aligned}W_{Q \rightarrow S} &= -\Delta E_P = E_{PQ} - E_{PS} \\ E_{PQ} &= -Gm \left(\frac{m_A}{d_{AQ}} + \frac{m_B}{d_{BQ}} \right) & E_{PS} &= -Gm \left(\frac{m_A}{d_{AS}} + \frac{m_B}{d_{BS}} \right) \Rightarrow W_{Q \rightarrow S} &= Gm \left(\frac{m_A}{d_{AS}} + \frac{m_B}{d_{BS}} - \frac{m_A}{d_{AQ}} - \frac{m_B}{d_{BQ}} \right) \\ W_{Q \rightarrow S} &= 6.67 \times 10^{-11} \left(\text{N} \cdot \frac{\text{m}^2}{\text{kg}^2} \right) \times 0.1 \text{ (kg)} \times 8.33 \text{ (kg/m)} & &= 5.6 \times 10^{-11} \text{ J}\end{aligned}$$

El trabajo es positivo, luego la bola se desplaza de manera espontánea bajo la acción de la fuerza del campo gravitatorio.

- c. Supongamos que el punto de equilibrio es un punto P, y d_{AP} la distancia entre la esfera A y el punto P:

$$\sum \vec{F} = 0 \Rightarrow \vec{F}_A + \vec{F}_B = 0 \Rightarrow \frac{-Gm m_A}{d_{AP}^2} + \frac{Gm m_B}{(1 \text{ m} - d_{AP})^2} = 0 \Rightarrow d_{AP} = \frac{1 \text{ m}}{\left(1 + \sqrt{m_B/m_A} \right)}$$

$$d_{AP} = 0.414 \text{ m}$$

NOTA: El símbolo **m** denota la magnitud (masa) y el símbolo **m** la unidad de longitud (metro).





3. Un electrón se mueve con velocidad constante $v_0 = 1.41 \times 10^6$ m/s a lo largo del eje +y. Calcule:

- El módulo, la dirección y el sentido del campo magnético que habría que aplicar para que el electrón describiera una trayectoria circular de diámetro 10 cm en sentido horario. (1 punto)
- El módulo, la dirección y el sentido de la fuerza que actúa sobre el electrón. (0.5 puntos)
- Calcule el radio de la trayectoria y el sentido de giro de un protón bajo la acción del mismo campo magnético. (0.5 puntos)

SOLUCIÓN


- a. El sentido del campo magnético debe ser a lo largo del eje -OZ.



$$F_M = F_C \Rightarrow |q_e|v_0B = m_e \frac{v_0^2}{R} \Rightarrow B = \frac{m_e v_0}{|q_e|R} = \frac{9.1 \times 10^{-31} \text{ (kg)} \times 1.41 \times 10^6 \text{ (m/s)}}{1.6 \times 10^{-19} \text{ (C)} \times 0.05 \text{ (m)}} = 1.6 \times 10^{-4} \text{ T}$$

$$\vec{B} = -1.6 \times 10^{-4} \text{ T} \vec{k}$$

- b. Un electrón tiene carga negativa, luego el sentido de la fuerza es opuesto al del producto vectorial de la velocidad por el campo magnético.



$$F_M = |q_e|v_0B = 1.6 \times 10^{-19} \text{ (C)} \times 1.41 \times 10^6 \text{ (m/s)} \times 1.6 \times 10^{-4} \text{ (T)} = 3.6 \times 10^{-17} \text{ N}$$

$$\vec{F} = 3.6 \times 10^{-17} \text{ N} \vec{i}$$

- c. El sentido de giro del protón bajo la acción del mismo campo magnético será ahora antihorario puesto que la carga del protón es positiva y el sentido de la fuerza es el mismo que el del producto vectorial de la velocidad por el campo magnético.

$$F_M = F_C \Rightarrow |q_e|v_0B = m_p \frac{v_0^2}{R} \Rightarrow B = \frac{m_p v_0}{|q_e|R} \Rightarrow R = \frac{m_p v_0}{|q_e|B} = \frac{1.7 \times 10^{-27} \text{ (kg)} \times 1.41 \times 10^6 \text{ (m/s)}}{1.6 \times 10^{-19} \text{ (m/s)} \times 1.6 \times 10^{-4} \text{ (T)}} \Rightarrow R = 94 \text{ m}$$

$$\vec{F} = -3.6 \times 10^{-17} \text{ N} \vec{i} \text{ para el protón}$$



4. Dos cargas puntuales con cargas $q_1 = 10 \mu\text{C}$ y $q_2 = -40 \mu\text{C}$ se disponen en el vacío en posiciones fijas separadas 1 m una de otra. Determinar:
- Un punto A donde se anule el campo eléctrico. (0.5 puntos)
 - Un punto B donde sea nulo el potencial eléctrico. (0.5 puntos)
 - El trabajo para trasladar un protón desde el punto A al punto B. (1 punto)

SOLUCIÓN

- a. Si suponemos que la carga q_2 está a la derecha de la carga q_1 , el campo eléctrico se anulará en algún punto A situado a la izquierda de la carga q_1 , pues es en esa región donde los campos eléctricos tienen sentidos opuestos y para que puedan igualarse sus módulos y anularse el campo resultante, debe ser un punto más próximo a la carga de menor valor.

$$\sum \vec{E} = 0 \Rightarrow \vec{E}_{1A} + \vec{E}_{2A} \quad E_{1A} = E_{2A} \Rightarrow K \frac{q_1}{d_A^2} = K \frac{-q_2}{(d_A + 1 \text{ m})^2} \Rightarrow \frac{q_1}{d_A^2} = -\frac{q_2}{(d_A + 1 \text{ m})^2}$$
$$q_1(d_A + 1 \text{ m})^2 = -q_2 d_A^2 \Rightarrow 1(d_A + 1 \text{ m})^2 = 4d_A^2 \Rightarrow d_A + 1 \text{ m} = 2d_A \Rightarrow d_A = 1 \text{ m}$$

El punto A está situado en la recta que une q_1 y q_2 , a una distancia de 1 m de q_1 y a 2 m de q_2 .

-
- b. El potencial eléctrico se anulará en algún punto B situado en la recta que une q_1 y q_2

$$V_{1B} + V_{2B} = 0 \Rightarrow K \frac{q_1}{d_B} + K \frac{q_2}{d_B + 1 \text{ m}} = 0 \Rightarrow \frac{q_1}{d_B} = -\frac{q_2}{d_B + 1 \text{ m}}$$
$$q_1(d_B + 1 \text{ m}) = -q_2 d_B \Rightarrow 1(d_B + 1 \text{ m}) = 4d_B \Rightarrow 3d_B = 1 \text{ m} \Rightarrow d_B = 0.33 \text{ m}$$

El punto B está situado en la recta que une q_1 y q_2 , a una distancia de 0,33 m de q_1 y a 1,33 m de q_2 .

-
- c. $W_{A \rightarrow B} = -\Delta E_P = E_{PA} - E_{PB}$
 $E_{PA} = q_p(V_{A1} + V_{A2}) = Kq_p \left(\frac{q_1}{d_{A1}} + \frac{q_2}{d_{A2}} \right) = 9 \times 10^9 (\text{N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2) \times 1.6 \times 10^{-19} (\text{C}) \times 1 \times 10^{-6} \times \left(10 - \frac{40}{2} \right) (\text{C}/\text{m})$
$$E_{PA} = -1.44 \times 10^{-14} \text{ J}$$

$$E_{PB} = q_p(V_{B1} + V_{B2}) = 0 \text{ J}$$

$$W_{A \rightarrow B} = -\Delta E_P = E_{PA} - E_{PB} \Rightarrow W_{A \rightarrow B} = -1.44 \times 10^{-14} \text{ J}$$


$W < 0$, luego se debe realizar trabajo externo para trasladar al protón del punto A al punto B.



5. Un objeto de 7 cm de altura se coloca 10 cm a la izquierda de una lente delgada divergente de distancia focal 25 cm.
- Dibuje el diagrama de rayos principales mostrando la formación de la imagen. (1.25 puntos)
 - Determine: la posición, la orientación, el tamaño y la naturaleza de la imagen. (0.75 puntos)

SOLUCIÓN

a.



b.

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'} \Rightarrow \frac{1}{s'} - \frac{1}{-0.1 \text{ (m)}} = \frac{1}{-0.25 \text{ (m)}} \Rightarrow \frac{1}{s'} = -14 \text{ (m}^{-1}\text{)} \Rightarrow s' \cong -0.07 \text{ m}$$

$(s' < 0 \text{ imagen virtual})$

$$\frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} \Rightarrow y' = \frac{-1/14}{-1/10} y \Rightarrow y' = \frac{5}{7} y \quad (y' > 0 \text{ Derecha})$$
$$y' = \frac{5}{7} y = \frac{5}{7} \times 0.07 \text{ m} \Rightarrow y' = 0.05 \text{ m} \quad (|y'| < |y| \text{ Menor})$$



6. Una cuerda larga y tensa tiene uno de sus extremos fijo a una pared. El otro extremo lo agarra una persona proporcionándole un movimiento vertical sinusoidal con una frecuencia de 2 Hz y una amplitud de 7.5 cm. La velocidad de propagación de la onda a lo largo de la cuerda es $v = 12$ m/s. En el instante inicial, $t = 0$, el extremo sujetado por la persona está en la posición de máximo desplazamiento vertical positivo e instantáneamente en reposo. Asumimos que no existen ondas propagándose desde el extremo fijo de la cuerda ni amortiguación debida al rozamiento con el aire.
- Calcule y exprese en unidades del Sistema Internacional la amplitud de la onda, la frecuencia angular, el periodo, la longitud de onda y el número de onda. (1 punto)
 - Escriba la ecuación de la onda y determine la elongación de un punto de la cuerda cuando su velocidad es máxima. (1 punto)

SOLUCIÓN

- a. Llamamos f a la frecuencia para no confundirla con la velocidad, v .

$$A = 7.5 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$\omega = 2\pi f \quad \omega = 2\pi \text{ rad} \times 2 \text{ s}^{-1} = 4\pi \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1} = 12.6 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{2 \text{ s}^{-1}} = 0.5 \text{ s}$$

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{12 \text{ m/s}}{2 \text{ s}^{-1}} = 6 \text{ m}$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad k = \frac{2\pi \text{ rad}}{6 \text{ m}} = \frac{\pi \text{ rad}}{3 \text{ m}} = 1.05 \text{ rad m}^{-1}$$

- b. Ecuación general de una onda $y(x,t) = A \sen(\omega t - kx + \varphi_0)$

$$\text{Para } t = 0 \text{ s} \quad y(0,0) = A \quad A = A \sen \varphi_0 \quad \varphi_0 = \arcsen 1 = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$$

$$\text{Ecuación de la onda } y(x,t) = 7.5 \times 10^{-2} \sen(4\pi t - \frac{\pi}{3}x + \frac{\pi}{2})$$

$$v(x,t) = \frac{dy(x,t)}{dt} = \omega A \cos(\omega t - kx + \varphi_0) \quad \text{De donde,} \quad v = \omega \sqrt{A^2 - y^2}$$

como $v_{\max} = \omega A$ para cualquier punto de la cuerda su velocidad será máxima cuando su elongación sea nula.



7. El isótopo ^{57}Co , por captura de un electrón, decae a ^{57}Fe con un período de semidesintegración de 272 días. El núcleo de ^{57}Fe se produce en un estado excitado, y casi instantáneamente emite rayos gamma que pueden ser detectados. Calcule para una muestra radiactiva de ^{57}Co :
- La vida media y la constante de desintegración radiactiva del ^{57}Co . (1 punto)
 - El número de moles del isótopo ^{57}Co en la muestra si la actividad inicial es de 7.1×10^{16} Bq. (1 punto)
-

SOLUCIÓN

- Es conveniente en primer lugar convertir el período de semidesintegración a segundos y luego calcular la vida media, τ y la constante de desintegración, λ :

$$\tau = \frac{T_{1/2}}{\ln 2} = \frac{272 \text{ (días)} \times 86400 \text{ (s/día)}}{0.693} \Rightarrow \tau = 3.39 \times 10^7 \text{ s} = 392.5 \text{ días}$$
$$\lambda = \frac{1}{\tau} = 2.95 \times 10^{-8} \text{ s}^{-1}$$

- En primer lugar, se debe calcular el número de núcleos, N , a partir de la actividad inicial, A , para luego obtener el número de moles:

$$A = \lambda N \Rightarrow N = \frac{A}{\lambda} = \frac{7.1 \times 10^{16} \text{ (Bq)}}{2.95 \times 10^{-8} \text{ (s}^{-1})} = 2.41 \times 10^{24} \text{ núcleos}$$
$$\text{nº de moles} = \frac{N}{N_A} = 4 \text{ moles}$$

8. Un electrón posee una energía cinética de 0.5 eV. Calcule:

- La longitud de onda asociada al electrón. (1 punto)
 - La longitud de onda de un fotón con la misma energía de 0.5 eV. (1 punto)
-

SOLUCIÓN

a.

$$E_C = \frac{1}{2} m_e v_e^2 \Rightarrow v_e = \sqrt{\frac{2E_C}{m_e}} = \sqrt{\frac{2 \times 0.5 \text{ (eV)} \times 1.6 \times 10^{-19} \left(\frac{\text{C}}{\text{electrón}}\right)}{9.1 \times 10^{-31} \text{ (kg)}}} = 4.19 \times 10^5 \text{ m/s}$$
$$\lambda_e = \frac{h}{m_e v_e} = \frac{6.626 \times 10^{-34} \text{ (kg} \cdot \text{m}^2/\text{s)}}{9.1 \times 10^{-31} \text{ (kg)} \times 4.19 \times 10^5 \text{ (m/s)}} \Rightarrow \lambda_e = 1.74 \times 10^{-9} \text{ m}$$

b.

$$E = \frac{hc}{\lambda} \Rightarrow \lambda = \frac{hc}{E} = \frac{6.626 \times 10^{-34} \left(\text{kg} \cdot \frac{\text{m}^2}{\text{s}}\right) \times 3 \times 10^8 \left(\frac{\text{m}}{\text{s}}\right)}{0.5 \times 1.6 \times 10^{-19} (\text{J})} \Rightarrow \lambda = 2.48 \times 10^{-6} \text{ m}$$



ANEXO

CONCRECIÓN CURRICULAR DE LOS SABERES BÁSICOS DE LA MATERIA DE FÍSICA

BLOQUE A. CAMPO GRAVITATORIO.

| PROPIEDAD | Competencias Específicas | | | | | |
|--|--------------------------|------------|-------------------|-----|-----|-----|
| | Criterios de Evaluación | | | | | |
| | CE1 | CE2 | CE3 | CE4 | CE5 | CE6 |
| 1. Calcular la intensidad de campo gravitatorio creado por la Tierra u otros planetas en un punto exterior al planeta. Evaluar su variación con la distancia desde la superficie del planeta que lo origina, hasta el punto que se considere y relacionarlo con la aceleración de la gravedad en su superficie. | 1.2 | 2.2 | 3.1 | | | 6.2 |
| 2. Aplicar el principio de superposición a una distribución de varias masas puntuales situadas en el mismo plano para determinar: el campo gravitatorio creado por ellas, el punto de dicho campo donde se cumplen unas determinadas condiciones o el valor que han de tener las masas conocido el campo resultante en un punto determinado. | 1.2 | 2.1 | 3.1 3.2 3.3 | | | 6.1 |
| 3. Representar, desde un punto de vista cualitativo, líneas de campo y superficies equipotenciales en el espacio generadas por: una masa, dos masas iguales y dos masas distintas. | | 2.1 2.2 | 3.2 | | | 6.1 |
| 4. Razonar las variaciones que se producen en los valores de velocidad y tiempo de caída libre de cuerpos sometidos a campos gravitatorios mayores y menores al de la Tierra. | | 2.1 | 3.3 | | 5.1 | |



| | | | | | | | |
|--|-----|--------------------------|-------------------|--|-----|-----|--|
| 5. Representar gráficamente la variación del módulo del campo, $g(r)$, y/o del potencial gravitatorio, $V_g(r)$, en función de la distancia [r (distancia) $\geq R$ (radio de la masa)] a la masa que crea el campo: ($g(r)$ vs r) y/o ($V_g(r)$ vs r). Obtener datos a partir de una representación gráfica dada. | 2.1 | 3.2 3.3 | | | | | |
| - Momento angular de un objeto en un campo gravitatorio: cálculo, relación con las fuerzas centrales y aplicación de su conservación en el estudio de su movimiento. | | | | | | | |
| PROPIEDAD DE CONCRECIÓN | | Competencias Específicas | | | | | |
| | | Criterios de Evaluación | | | | | |
| 6. Deducir la conservación del momento angular de los planetas que giran alrededor del Sol. Calcular la velocidad areolar de un planeta del Sistema Solar (respecto del Sol) a partir del momento angular. | 1.2 | 2.1 2.2 | 3.2 3.3 | | | 6.1 | |
| 7. Aplicar la conservación del momento angular de un planeta o de un satélite para calcular en el afelio y el perihelio: las velocidades de dicho cuerpo, los momentos angulares, las energías cinéticas y las energías potenciales, conocidos los valores del R_{afelio} y del $R_{perihelio}$ o su relación y viceversa. | 1.2 | 2.1 2.2 | 3.2 3.3 | | 5.1 | | |
| - Energía mecánica de un objeto sometido a un campo gravitatorio: deducción del tipo de movimiento que posee, cálculo del trabajo o los balances energéticos existentes en desplazamientos entre distintas posiciones, velocidades y tipos de trayectorias. | | | | | | | |
| PROPIEDAD DE CONCRECIÓN | | Competencias Específicas | | | | | |
| | | Criterios de Evaluación | | | | | |
| 8. Determinar la energía necesaria o la velocidad de lanzamiento para poner en órbita un satélite partiendo desde la superficie de un planeta o desde una órbita a otra. Deducir el tipo de órbita que describirá un cuerpo conocido el valor, mayor o menor que cero, de su energía mecánica. | 1.2 | 2.1 2.3 | 3.1 3.2 3.3 | | 5.1 | 6.1 | |
| 9. Calcular el trabajo realizado por el campo gravitatorio o por fuerzas externas sobre una masa que se desplaza entre dos puntos del campo a partir de la variación de su energía potencial. Relacionar el | 1.2 | 2.1 | 3.1 3.2 | | 5.1 | | |



| | | | | | | | |
|---|-----|--------------------------|-------------------|-------------------|-----|-----|-----|
| signo de la variación de la energía potencial con el movimiento espontáneo o no de las masas en el campo. Utilizar la relación entre el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria y las variaciones de energía cinética y potencial para la resolución de problemas. | | | 3.3 | | | | |
| 10. Aplicar el principio de conservación de la energía mecánica en la caída libre de un objeto en el seno del campo gravitatorio de un planeta, considerando despreciable el rozamiento con una posible atmósfera. | 1.2 | 2.1 2.3 | 3.1 3.2 3.3 | | 5.1 | 6.1 | |
| - Leyes que se verifican en el movimiento planetario y extrapolación al movimiento de satélites y cuerpos celestes. | | | | | | | |
| PROPIEDAD CONCRETA | | Competencias Específicas | | | | | |
| | | Criterios de Evaluación | | | | | |
| | | CE1 | CE2 | CE3 | CE4 | CE5 | CE6 |
| 11. Relacionar la fuerza de atracción gravitatoria con la aceleración normal de las trayectorias orbitales. Deducir las expresiones que relacionan radio, velocidad orbital, periodo de rotación y masa del cuerpo central, aplicándolas a la resolución de problemas numéricos. Determinar las magnitudes que caracterizan el movimiento de un satélite, incluidos los geoestacionarios. | | | | | | | 6.1 |
| 12. Deducir e interpretar la relación existente entre los radios y los períodos de las órbitas de los planetas en un sistema planetario respecto de una estrella central (como el solar), o de los satélites respecto del correspondiente planeta, a partir de la ley de Gravitación Universal. Calcular las magnitudes que caracterizan el movimiento de los planetas de un sistema estelar a partir de datos tabulados de los radios y períodos orbitales de otros planetas del sistema. Determinar la masa de un objeto celeste (estrella o planeta) a partir de datos orbitales de alguno de sus respectivos planetas o satélites. | | 1.2 | 2.1 3.2 3.3 | 3.1 3.2 3.3 | | 5.1 | 6.1 |



| <p>- Introducción a la cosmología y la astrofísica como aplicación del campo gravitatorio: implicación de la física en la evolución de objetos astronómicos, del conocimiento del universo y repercusión de la investigación en estos ámbitos en la industria, la tecnología, la economía y en la sociedad, especialmente en el caso asturiano.</p> | | | | | | |
|---|------------|-----|-----|--------------------------|-----|--|
| PROPIEDAD DE CONCRECIÓN | | | | Competencias Específicas | | |
| | | | | Criterios de Evaluación | | |
| CE1 | CE2 | CE3 | CE4 | CE5 | CE6 | |
| 1.1 | 2.1 2.3 | 3.1 | | 5.1 5.2 | 6.1 | |
| | 2.1 2.3 | 3.1 | | | 6.1 | |
| | 2.1 2.3 | 3.1 | | 5.1 5.2 | | |
| 1.1 | 2.3 | 3.3 | | 5.1 5.2 | | |



BLOQUE B. CAMPO ELECTROMAGNÉTICO.

| PROPIEDAD CONCRETA | Competencias Específicas | | | | | |
|---|--------------------------|-----|------------|-----|------------|-----|
| | Criterios de Evaluación | | | | | |
| | CE1 | CE2 | CE3 | CE4 | CE5 | CE6 |
| 17. Identificar el campo eléctrico como un campo conservativo, asociándole una energía potencial eléctrica a las cargas situadas en el campo y un potencial eléctrico en cada uno de sus puntos. Aplicación del principio de superposición para el cálculo de las diferentes variables que describen la interacción eléctrica (campo, potencial, fuerza y energía potencial). | 1.2 | 2.1 | 3.2 3.3 | | | 6.1 |
| 18. Diferenciar los conceptos que describen la interacción eléctrica (campo, fuerza, energía potencial eléctrica y potencial eléctrico). Comparar con el campo gravitatorio, analogías y diferencias. Posibilidad de cuerpos en ambos campos. | | 2.1 | 3.3 | | 5.1 5.2 | 6.1 |
| 19. Estudiar las variables cinemáticas y dinámicas del movimiento de un cuerpo cargado según la orientación de su velocidad respecto a la dirección del campo eléctrico. | 1.2 | 2.1 | 3.2 3.3 | | | |
| 20. Deducir la relación entre el campo magnético y el campo eléctrico para que una partícula cargada se mueva con movimiento rectilíneo uniforme. | 1.2 | 2.1 | | | | 6.2 |
| 21. Determinar la dirección y sentido del campo magnético creado por cargas eléctricas en movimiento. Establecer la relación entre la dirección del campo magnético y el campo eléctrico que crean estas cargas. | | 2.1 | | | | 6.2 |



| | | | | | | |
|--|-----|------------|-------------------|--|--|-----|
| <p>22. Determinar las fuerzas que ejercen los campos magnéticos sobre partículas cargadas en movimiento. Calcular la fuerza ejercida por un campo magnético sobre una partícula cargada en movimiento y otras magnitudes relacionadas con el movimiento que bajo su acción realiza la partícula cargada.</p> <p>23. Aplicaciones tecnológicas del movimiento de partículas cargadas en presencia de campos eléctricos y magnéticos: selector de velocidades, ciclotrón y espectrómetro de masas. Cálculos de las magnitudes involucradas.</p> | 1.2 | 2.1 | 3.2 3.3 | | | 6.1 |
| <p>- Intensidad del campo eléctrico en distribuciones de cargas discretas, y continuas: cálculo e interpretación del flujo de campo eléctrico.</p> <p>- Líneas de campo eléctrico producido por distribuciones de carga sencillas en distintas configuraciones geométricas.</p> | 1.2 | 2.1 2.3 | 3.3 | | | |
| PROPIEDADES ELÉCTRICAS DE LOS MATERIALES | | | | | | |
| PROPIEDADES MAGNÉTICAS DE LOS MATERIALES | | | | | | |
| <p>24. Reconocer el convenio por el que se dibujan las líneas de fuerza del campo eléctrico y aplicarlo a casos del campo creado por una o dos cargas puntuales de igual o diferente signo y/o magnitud.</p> <p>25. Calcular la intensidad de campo eléctrico creado en un punto por una o varias cargas puntuales (dispuestas en línea o en otras geometrías sencillas contenidas en un plano) aplicando el principio de superposición. Hallar el punto donde el campo resultante creado por varias cargas toma un valor concreto o cumple unas determinadas condiciones (ser nulo, anularse una componente, etc.)</p> <p>26. Calcular el flujo del campo eléctrico a través de una superficie determinada en casos sencillos.</p> | 1.2 | 2.1 2.2 | 3.3 | | | 6.1 |
| | 1.2 | 2.1 2.2 | 3.1 3.2 3.3 | | | |
| | 1.2 | 2.1 2.2 | 3.1 3.2 3.3 | | | |



| | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|--|-----|---------------------------------|
| <p>27. Calcular y comparar en distintos puntos el campo eléctrico creado por distribuciones continuas de carga con geometría sencilla (esferas, hilos y superficies planas)</p> | 1.2 2.2 | 2.1 3.2 | 3.1 3.2 | | 5.1 | 6.1 |
| <p>- Energía de una distribución de cargas estáticas: magnitudes que se modifican y que permanecen constantes con el desplazamiento de cargas libres entre puntos de distinto potencial eléctrico.</p> | | | | | | |
| <p>PROPIEDADES Y CONSECUENCIAS</p> | | | | | | <p>Competencias Específicas</p> |
| | | | | | | Criterios de Evaluación |
| <p>28. Calcular el potencial eléctrico creado en un punto por una o varias cargas puntuales (dispuestas en línea o en otras geometrías sencillas contenidas en un plano) aplicando el principio de superposición. Hallar el punto donde el potencial resultante toma un valor concreto o cumple unas determinadas condiciones.</p> | 1.2 2.2 | 2.1 3.3 | 3.2 | | | |
| <p>29. Determinar el trabajo para trasladar una carga eléctrica de un punto a otro en el seno de un campo eléctrico en términos de variación de energía. Relacionar el signo de la variación de energía (o del trabajo) con el movimiento espontáneo de las cargas.</p> | 1.2 2.2 | 2.1 3.3 | 3.2 | | | |
| <p>30. Utilizar conjuntamente la definición de trabajo de una fuerza y el trabajo realizado por la fuerza conservativa del campo para la resolución de problemas de movimiento de cargas puntuales en el seno de campos eléctricos uniformes.</p> | | | 2.1 3.3 | | | 6.1 |
| <p>- Campos magnéticos generados por hilos con corriente eléctrica en distintas configuraciones geométricas: rectilíneos, espiras, solenoides o toros. Interacción con cargas eléctricas libres presentes en su entorno.</p> | | | | | | |
| <p>- Líneas de campo magnético producido por imanes e hilos con corriente eléctrica en distintas configuraciones geométricas.</p> | | | | | | |
| <p>PROPIEDADES Y CONSECUENCIAS</p> | | | | | | <p>Competencias Específicas</p> |
| | | | | | | Criterios de Evaluación |



| | CE1 | CE2 | CE3 | CE4 | CE5 | CE6 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------|
| 31. Interpretar la influencia de la corriente eléctrica que circula por un conductor sobre el movimiento que provoca en una aguja imantada. | | 2.1 | | | 5.2 | 6.1 |
| 32. Calcular el campo magnético (módulo, dirección y sentido) producido por distribuciones de corriente sencillas (rectilíneos, espiras y solenoides) y dibujar las correspondientes líneas de campo. | 1.2 | 2.1 | 3.2 | | 5.2 | 6.1 |
| 33. Deducir la relación entre la fuerza que ejerce el campo magnético generado por un conductor sobre cargas libres en movimiento en su entorno y el valor, dirección y sentido de la corriente que circula por él. Aplicar en la resolución de problemas sencillos | 1.2 | 2.1 | 3.2 | | 5.2 | 6.1 |
| 34. Analizar la variación de la intensidad del campo magnético creado por un conductor rectilíneo con la intensidad y el sentido de la corriente eléctrica que circula por él y con la distancia al hilo conductor | 1.2 | 2.1 | 3.3 | | | |
| 35. Determinar puntos donde el campo magnético resultante debido a dos hilos conductores u otras distribuciones de corriente sencillas tome un determinado valor o cumpla unas determinadas condiciones. | 1.2 | 2.1 | 3.2 | | | |
| 36. Deducir la expresión que permite calcular la fuerza magnética por unidad de longitud entre conductores rectilíneos paralelos. Determinar la fuerza magnética (módulo, dirección y sentido), ejercida sobre un conductor por uno o más conductores rectilíneos paralelos a éste. | 1.2 | 2.1 | 3.2 | | | |
| - Generación de la fuerza electromotriz: funcionamiento de motores, generadores y transformadores a partir de sistemas donde se produce una variación del flujo magnético. | | | | | | |
| PROPIEDADES MAGNÉTICAS DE LOS CONDUCTORES | | | | | | Competencias Específicas |
| | | | | | | Criterios de Evaluación |
| | | | | | | CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 |



| | | | | | | |
|---|-----|------------|------------|--|-----|-----|
| 37. Determinar justificadamente la variación del flujo magnético en diferentes casos (variación temporal de campo o de orientación con la superficie). | | 2.1 2.2 | 3.3 | | 5.2 | 6.1 |
| 38. Interpretar y determinar el sentido de la corriente eléctrica inducida en una espira conductora a partir de gráficos o situaciones (ilustraciones) en las que se muestra un movimiento relativo entre un imán y la espira en la dirección de su eje. Determinar la expresión de la fem de un generador de corriente alterna, conocidos la frecuencia de giro y los valores máximo y mínimo de la fem inducida. | 1.2 | 2.1 2.2 | 3.2 3.3 | | 5.2 | |
| 39. Aplicar las leyes de Faraday y Lenz para calcular la fuerza electromotriz inducida en un circuito por la variación del flujo magnético. Determinar el sentido de la corriente eléctrica y el valor de su intensidad conocida la resistencia del circuito. | 1.2 | 2.1 2.2 | 3.2 3.3 | | 5.2 | 6.1 |
| 40. Interpretar gráficas de flujo magnético o fuerza electromotriz inducida en función del tiempo para extraer la información necesaria y/o realizar cálculos pertinentes. Aplicar de forma correcta la ley de Faraday y Lenz para responder preguntas de razonamiento sobre la misma. | 1.2 | 2.1 2.2 | 3.2 3.3 | | 5.2 | |
| 41. Describir cualitativamente el funcionamiento de un transformador a partir de un esquema gráfico. Calcular intensidades, tensiones o número de vueltas de un transformador. | | 2.1 2.2 | 3.2 3.3 | | 5.2 | |



BLOQUE C. VIBRACIONES Y ONDAS.

| PROPIEDAD DE CONCRECIÓN | Competencias Específicas | | | | | |
|---|--------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|
| | Criterios de Evaluación | | | | | |
| | CE1 | CE2 | CE3 | CE4 | CE5 | CE6 |
| 42. Identificar y obtener los valores de los parámetros que definen un movimiento armónico simple (MAS) (periodo, fase inicial y amplitud) conocida su ecuación y/o interpretando las gráficas de posición, velocidad y aceleración frente al tiempo. Expresar la ecuación de un MAS conocidos estos parámetros. | 1.2 | 2.1 | 3.2 | | | 6.1 |
| 43. Determinar la velocidad, la aceleración, la energía cinética y la energía potencial de una partícula que oscila armónicamente en un instante o elongación dados y aplicar las relaciones entre estas variables en la resolución de problemas. | 1.2 | 2.1 | 3.2 | | 5.2 | 6.1 |
| 3.3 | | | | | | |
| PROPIEDAD DE CONCRECIÓN | Competencias Específicas | | | | | |
| | Criterios de Evaluación | | | | | |
| | CE1 | CE2 | CE3 | CE4 | CE5 | CE6 |
| 44. Reconocer que una onda es la propagación de una perturbación. Clasificación de las ondas según la necesidad o no de un medio material para su propagación. Clasificación de las ondas según la dirección de propagación y la forma del frente de ondas. Identificar los movimientos ondulatorios observables en la naturaleza con los distintos tipos de ondas. | | 2.1 2.2 | 3.1 | | | 6.1 |



| <p>45. Diferenciar el movimiento que describen los puntos del medio que son alcanzados por una onda mecánica y el movimiento de la propia onda. Distinguir entre la velocidad de propagación de la onda y la velocidad de oscilación de una partícula alcanzada por la onda.</p> | | 2.2 2.2 | 3.1 3.2 3.3 | | 5.2 | |
|---|-----|-------------------|-------------------|--------------------------|-----|--|
| <p>46. Deducir los valores de las magnitudes características (amplitud, frecuencia, periodo, fase inicial, longitud de onda, velocidad angular, número de onda, velocidad de propagación) de una onda armónica plana a partir de su ecuación y viceversa.</p> | 1.2 | 2.1 2.2 | 3.1 3.2 3.3 | | 5.1 | |
| <p>47. Interpretar las gráficas de elongación frente a distancia al foco emisor y de elongación frente a tiempo para obtener los parámetros que caracterizan un movimiento ondulatorio. Interpretar la doble periodicidad del movimiento ondulatorio.</p> | 1.2 | 2.1 2.2 | 3.1 3.2 3.3 | | | |
| <p>48. Calcular las diferentes magnitudes (elongación, velocidad de oscilación, aceleración) de los puntos del medio de propagación y la velocidad de propagación de la onda conocidas las relaciones entre ellas.</p> | 1.2 | 2.1 2.2 | 3.1 3.2 3.3 | | | |
| <p>- Fenómenos ondulatorios: situaciones y contextos naturales en los que se ponen de manifiesto distintos fenómenos ondulatorios y aplicaciones. Ondas sonoras y sus cualidades. Cambios en las propiedades de las ondas en función del desplazamiento del emisor y receptor.</p> | | | | | | |
| PROPIUESTA DE CONCRECIÓN | | | | Competencias Específicas | | |
| | | | | Criterios de Evaluación | | |
| CE1 | CE2 | CE3 | CE4 | CE5 | CE6 | |
| <p>49. Reconocer el umbral de audición humano como referente de intensidad sonora en la escala decibélica. Asumir las actuaciones a llevar a cabo para minimizar la contaminación acústica en pro de la consecución de los objetivos ODS de la Agenda 2030.</p> | | 2.1 2.2 2.3 | 3.1 3.2 3.3 | | 5.1 | |
| <p>50. Calcular la intensidad y sonoridad en los puntos de un medio por el que se propaga una onda sonora. Valorar la variación de estas magnitudes cuando se modifica la distancia al foco emisor.</p> | 1.2 | 2.1 | 3.1 3.2 3.3 | | 5.2 | |



| | | | | | | | |
|--|-----|--------------------------|-------------------|-----|------------|-----|-----|
| <p>51. Interpretar cualitativamente los fenómenos de interferencias entre movimientos ondulatorios (interferencia constructiva o destructiva, formación de nodos...). Generación de ondas estacionarias y sus características. Formación de armónicos en instrumentos.</p> | 1.2 | 2.1 | 3.1 3.2 3.3 | | 5.2 | 6.1 | |
| <p>52. Justificar la variación de la frecuencia de la onda que percibe el receptor, según su movimiento relativo respecto al foco emisor, Indicando si la frecuencia percibida es mayor o menor que la emitida, y/o el sonido percibido más agudo o grave que el emitido.</p> | | 2.1 2.3 | 3.1 3.3 | | 5.2 | 6.1 | |
| <p>- Naturaleza de la luz: controversias y debates históricos. La luz como onda electromagnética. Espectro electromagnético.</p> | | | | | | | |
| <p>PROPIEDADES DE LA LUZ</p> | | Competencias Específicas | | | | | |
| | | Criterios de Evaluación | | | | | |
| | | CE1 | CE2 | CE3 | CE4 | CE5 | CE6 |
| <p>53. Conocer los experimentos relevantes en la historia de la Física que justificaron la controversia histórica sobre la naturaleza ondulatoria o corpuscular de la luz. Explicar fenómenos cotidianos de la luz: reflexión, refracción y difracción, basados en su naturaleza ondulatoria.</p> | | 2.1 | 3.1 3.2 3.3 | | 5.1 5.2 | 6.1 | |
| <p>54. Ordenar los tipos de radiaciones del espectro electromagnético según su frecuencia, longitud de onda o energía.</p> | 1.2 | 2.1 2.3 | 3.2 3.3 | | | | |
| <p>- Formación de imágenes en medios y objetos con distinto índice de refracción. Sistemas ópticos: lentes delgadas, espejos planos y curvos y sus aplicaciones.</p> | | | | | | | |
| <p>PROPIEDADES DE LA LUZ</p> | | Competencias Específicas | | | | | |
| | | Criterios de Evaluación | | | | | |
| | | CE1 | CE2 | CE3 | CE4 | CE5 | CE6 |
| <p>55. Realizar el trazado de rayos correspondiente para esquematizar los fenómenos de refracción. Calcular los índices de refracción o ángulos de incidencia/refracción en estos fenómenos.</p> | 1.2 | 2.1 | 3.1 3.2 3.3 | | 5.2 | 6.1 | |



| | | | | | | |
|---|-----|------------|-------------------|--|-----|--|
| <p>56. Interpretar el fenómeno de reflexión total. Aplicar la relación necesaria entre los índices de refracción de dos medios para la existencia de reflexión total. Determinar el ángulo límite o el índice de refracción de uno de los medios conocida dicha relación.</p> | 1.2 | 2.1 | 3.1 3.2 3.3 | | 5.2 | |
| <p>57. Representar gráficamente (trazado de rayos) fenómenos ópticos producidos por diferentes sistemas ópticos: espejos planos, espejos curvos y lentes delgadas.</p> | | 2.1 | 3.1 3.2 3.3 | | 5.2 | |
| <p>58. Calcular la distancia objeto, la distancia imagen, las distancias focales, el aumento lateral, la altura del objeto o de la imagen para un sistema óptico dado, así como el radio de curvatura de un espejo y la potencia de una lente, aplicando las ecuaciones correspondientes o las relaciones geométricas de la representación gráfica del sistema óptico. Determinar, conocidas las características del objeto y de la imagen, los distintos parámetros que caracterizan el sistema óptico implicado.</p> | 1.2 | 2.1 | 3.1 3.2 3.3 | | 5.2 | |
| <p>59. Conocer la necesidad de combinar diferentes sistemas ópticos en dispositivos como: cámara fotográfica, microscopio, telescopio. Justificar la corrección de la lente adecuada para los defectos de visión del ojo humano (mediante la realización del trazado de rayos para la formación de la imagen en el ojo, antes y después del empleo de la lente).</p> | | 2.1 2.3 | 3.1 3.2 3.3 | | 5.2 | |



BLOQUE D. FÍSICA RELATIVISTA, CUÁNTICA, NUCLEAR Y DE PARTÍCULAS

| - Principios fundamentales de la Relatividad especial y sus consecuencias: contracción de la longitud, dilatación del tiempo, energía y masa relativistas. | | | | | | |
|--|--------------------------|-----|------------|-----|-----|-----|
| PROPIEDAD DE CONCRECIÓN | Competencias Específicas | | | | | |
| | Criterios de Evaluación | | | | | |
| | CE1 | CE2 | CE3 | CE4 | CE5 | CE6 |
| 60. Reconocer que la invariabilidad de la velocidad de la luz entra en contradicción con el Principio de relatividad de Galileo y que la consecuencia es el carácter relativo que adquieren el espacio y el tiempo. | | 2.1 | 3.3 | | | 6.1 |
| 61. Conocer evidencias experimentales de la teoría de la relatividad (Ejemplos: constancia de la velocidad de la luz a partir del estudio de las estrellas dobles, detección de muones en la superficie terrestre, relatividad del tiempo confirmada utilizando relojes atómicos dentro de aviones y satélites). | | 2.1 | | | | |
| 62. Resolver problemas de dilatación de tiempos y contracción de longitudes. Diferenciar el tiempo y longitud propios (t_0 y l_0) y relativistas según el movimiento del observador. | | 2.1 | 3.2 3.3 | | | |
| 63. Identificar la equivalencia entre masa y energía. Aplicar el principio de conservación masa y energía relativista en procesos de pares de partículas. | 1.2 | 2.1 | 3.2 3.3 | | | |
| - Dualidad onda-corpúsculo y cuantización: hipótesis de De Broglie y efecto fotoeléctrico. Principio de incertidumbre formulado en base al tiempo y la energía. | | | | | | |
| PROPIEDAD DE CONCRECIÓN | Competencias Específicas | | | | | |
| | Criterios de Evaluación | | | | | |



| | CE1 | CE2 | CE3 | CE4 | CE5 | CE6 |
|---|-----|-----|------------|--------------------------|------------|-----|
| 64. Aplicar la ecuación del efecto fotoeléctrico a la resolución de ejercicios numéricos. Cálculo de: trabajo de extracción, frecuencia umbral, longitud de onda umbral y potencial de frenado a partir de datos experimentales de la energía cinética de los electrones emitidos y de la frecuencia de la radiación incidente en el metal. | 1.2 | 2.1 | 3.2 | | 5.1 5.2 | 6.1 |
| 65. Analizar e interpretar representaciones gráficas experimentales (energía cinética máxima de los electrones o su potencial de frenado respecto a la frecuencia de la radiación incidente) para obtener a partir de ellas, pares de valores de las variables representadas que permitan determinar el trabajo de extracción del metal utilizado en el experimento o el valor experimental de la constante de Planck. | | 2.1 | 3.2 | | | |
| 66. Calcular la longitud de onda asociada a una partícula en movimiento (considerar correcciones relativistas para velocidades superiores a 10^7 m s^{-1}). Comparar longitudes de onda, dando respuestas en función de sus respectivos órdenes de magnitud, no limitarse a presentar sólo los valores obtenidos tras el cálculo de cada una de ellas. | 1.2 | 2.1 | 3.2 3.3 | | 5.2 | |
| 67. Expresar el principio de indeterminación de Heisenberg en términos de la posición y el momento lineal o en términos de energía y tiempo. Aplicar este principio en casos sencillos, dada la indeterminación de una de las dos magnitudes relacionadas. | | 2.1 | | | | 6.1 |
| - Modelo estándar en la física de partículas. Clasificaciones de las partículas fundamentales. Las interacciones fundamentales como procesos de intercambio de partículas (bosones). Aceleradores de partículas. | | | | | | |
| PROPIEDADES DE CONCRECIÓN | | | | Competencias Específicas | | |
| | | | | Criterios de Evaluación | | |
| | | | | CE1 | CE2 | CE3 |
| 68. Conocer el criterio de clasificación de las partículas elementales y sus tipos para completar tablas de partículas ya clasificadas o diferenciar partículas dadas según su tipo. | | | | 2.1 | | |
| 69. Relacionar las Interacciones fundamentales con las partículas asociadas a cada una de ellas. | | | | 2.1 | | |



| | | | | | |
|--|-------------------|------------|---------------------------------|------------|-----|
| <p>70. Determinar la carga u otra característica de una partícula elemental a partir de los datos proporcionados sobre su comportamiento en un acelerador de partículas.</p> | 2.1 2.3 | | | | |
| <p>- Núcleos atómicos y estabilidad de isótopos. Radiactividad natural y otros procesos nucleares. Aplicaciones en los campos de la ingeniería, la tecnología y la salud.</p> | | | | | |
| PROPIEDAD DE CONCRECIÓN | | | Competencias Específicas | | |
| | | | Criterios de Evaluación | | |
| <p>71. Aplicar la equivalencia masa y energía para justificar la energía de enlace en los núcleos atómicos, las variaciones de masa y la liberación de energía en los procesos nucleares. Calcular la energía de enlace y la energía de enlace por nucleón y relacionar ese valor con la estabilidad del núcleo.</p> | 1.2 | 2.1 3.3 | 3.2 3.3 | 5.2 | 6.1 |
| <p>72. Interpretar las gráficas ($A-Z$) /Z y las gráficas energía de enlace por nucleón/número de nucleones, para comparar la estabilidad de diferentes núcleos atómicos.</p> | | 2.1 | 3.2 3.3 | 5.1 5.2 | |
| <p>73. Distinguir los distintos tipos de radiactividad, según la necesidad de una partícula de bombardeo de núcleos. Diferenciar los tipos de procesos nucleares y de radiaciones que se emiten en estos procesos. Reconocer sus aplicaciones en el contexto de un caso práctico.</p> | | 2.1 2.3 | | 5.2 | 6.1 |
| <p>74. Utilizar las leyes de la conservación de la energía-materia, en las reacciones nucleares y la radiactividad.</p> | | 2.1 | 3.3 | 5.2 | 6.1 |
| <p>75. Comprender el carácter aleatorio de la desintegración nuclear de un núclido. Conocer los conceptos y magnitudes implicadas en este proceso: actividad, constante de desintegración radiactiva, periodo de semidesintegración y vida media. Aplicar la ley de desintegración radiactiva en la resolución de problemas sencillos contextualizados en casos de aplicación práctica.</p> | 1.2 2.1 2.3 | 3.2 3.3 | | 5.2 | |



Vicerrectorado de Estudiantes

Universidad de Oviedo
